

PAPER NAME

6. Agus Slamet_Agritech_versi ketik.pdf

WORD COUNT

3401 Words

CHARACTER COUNT

20439 Characters

PAGE COUNT

6 Pages

FILE SIZE

624.8KB

SUBMISSION DATE

Jan 4, 2024 9:42 AM GMT+7

REPORT DATE

Jan 4, 2024 9:43 AM GMT+7

● 16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 9% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 12 words)
- Manually excluded sources
- Manually excluded text blocks

Potensi Hipolipidemik Yogurt dari Isolat Protein Biji Kecipir (*Psophocarpus tetragonolobus*) pada Tikus Hiperkolesterol dengan Perlakuan Jumlah Pakan

Hypolipidemic Potencial of Yogurt from Protein Isolate of Winged Bean (*Psophocarpus tetragonolobus*)
in Hypercholesterol Rats with The Amount of Feed Treatment

Agus Slamet, Bayu Kanetro

16
Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Agroindustri, Universitas Mercu Buana
Jl. Wates Km. 10 Yogyakarta 55753, Indonesia
Email: agusumby@yahoo.com

Submisi: 16 November 2015; Penerimaan: 4 April 2016

ABSTRAK

Biji kecipir memiliki kadar protein yang hampir sama dengan kedelai, namun bau langunya lebih tajam daripada kedelai, sehingga perlu diisolasi proteinnya sebelum digunakan sebagai bahan baku yogurt. Tujuan penelitian ini adalah menentukan potensi hipokolesterolemik yogurt isolat proteun biji kecipir melalui uji biologis *in vivo* menggunakan tikus jantan *Sprague Dawley*. Perlakuan penelitian ini adalah perlakuan pakan yogurt dengan konsentrasi 0 (pakan standar tanpa penambahan yogurt sebagai kontrol), 2, dan 4 g yogurt/hari berturut-turut sebagai perlakuan konsentrasi rendah dan tinggi selama 4 minggu perlakuan pakan yogurt sesudah pemberian pakan hiperkolesterol selama 1 minggu. Profil lipida darah tikus meliputi kadar trigliserida, total kolesterol, kolesterol *High Density Lipoprotein* (HDL), dan *Low Density Lipoprotein* (LDL) dianalisis pada minggu ke 2 dan 4 minggu selama perlakuan pakan yogurt dan sebelum perlakuan pakan yogurt yaitu pada fase pemeliharaan adaptasi dan 1 minggu pada fase pemeliharaan hiperkolesterol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa trigliserida, total kolesterol, dan kolesterol LDL meningkat dan kolesterol HDL menurun selama fase pemberian pakan hiperkolesterol sebelum perlakuan pakan yogurt. Potensi hipokolesterol yogurt isolat protein biji kecipir ditunjukkan dengan penurunan trigliserida, total kolesterol, dan kolesterol LDL, serta peningkatan kolesterol HDL sesudah perlakuan pakan yogurt dengan konsentrasi rendah maupun tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa yogurt isolat protein biji kecipir mampu menurunkan kolesterol

Kata kunci: Hipokolesterol; isolat protein; kecipir; yogurt

ABSTRACT

Protein content of winged bean is almost the same as soybean, but the beany flavor is more powerful than soybean. Therefore the protein of winged bean was isolated prior to use as raw material of yogurt. This research was aimed to determine the potency of hypocholesterolemic activity of yogurt protein isolate of winged bean through *in vivo* bioassay by using *Sprague Dawley* male rats. The treatments of the research were yogurt feed treatment with concentration of yogurt 0 (standard feed without yogurt as a control), 2, and 4 g yogurt/day as low and high concentration treatment respectively for 4th weeks after hypercholesterol feed treatment for 1 week. The blood lipid profile of rats, including triglyceride, cholesterol total, High Density Lipoprotein (HDL), Low Density Lipoprotein (LDL) cholesterol were analysed on the 2nd and 4th weeks for the yogurt feed treatment while for before yogurt feed treatment, the evaluation were based on the adaptation phase and the 1st week for hypercholesterol phase. The result of this research showed that the blood triglyceride, cholesterol total, LDL increased, and the blood HDL decreased in hypercholesterol phase before

yogurt feed treatment. The potency of hypocholesterolemic of yogurt from protein isolate of winged bean was shown by the decreasing of blood triglyceride, cholesterol total, LDL and increasing the HDL cholesterol after the yogurt feed treatment with low and high concentration. That indicated that yogurt that was made of protein isolate of winged bean could reduced cholesterol.

Keywords: Hypocholesterolemic; protein isolate; winged bean; yogurt

PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, selalu diikuti dengan perubahan pola konsumsi. Perubahan pola makan kearah konsumsi tinggi lemak berakibat pada peningkatan kadar kolesterol dalam darah, atau hiperkolesterolemia. Indonesia pada saat ini menunjukkan kejadian penderita hiperkolesterolemia yang semakin meningkat. Hal ini diketahui dengan semakin meningkatnya penderita stroke, hipertensi dan penyakit jantung koroner (Purwanto, 2001). Angka kejadian stroke di Indonesia meningkat dengan tajam. Bahkan saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita stroke terbesar di Asia. Sudomo (2007), menyebutkan bahwa setiap tahun terjadi 500.000 penduduk terkena serangan stroke, sekitar 2,5 % atau 125.000 orang meninggal dan sisanya cacat ringan atau berat.

Hiperlipidemia/hiperkolesterolemia berkaitan erat dengan keadaan atherosklerosis yang merupakan penyebab timbulnya penyakit kardiovaskuler (Purwanto, 2008). Di Indonesia penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian nomor satu pada orang dewasa (usia di atas 35 tahun) untuk wilayah perkotaan atau sekitar 31 % dari total penyebab kematian. Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Dunia (2002), tercatat 4,4 juta kematian disebabkan oleh hiperkolesterol, atau 7,9 % dari total kematian di usia muda.

Pencegahan peningkatan kadar kolesterol darah mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat. Pencegahan hiperlipidemia secara gizi dilakukan dengan mengurangi konsumsi lemak jenuh, kolesterol, gula, alkohol dan memperbanyak konsumsi serat pangan (Purwanto, 2008). Pencegahan menggunakan bahan alami dapat dilakukan dengan konsumsi yogurt secara rutin.

Yogurt adalah makanan hasil fermentasi yang bermanfaat sebagai probiotik. Pangan probiotik berpotensi menurunkan kadar kolesterol darah. Hal ini dinyatakan oleh beberapa peneliti (Drake dkk., 2000; Lin dkk., 2005; Larkin dkk., 2007; Rossi dkk., 2005). Pada umumnya yogurt dibuat dari susu hewani, akan tetapi susu nabati dari kacang-kacangan juga berpotensi sebagai bahan pembuatan yogurt. Hipokolesterolemik yogurt susu nabati dari kacang-kacangan kemungkinan lebih baik dari susu hewani. Protein kacang-kacangan telah diketahui lebih bersifat hipokolesterolemik dari pada protein susu hewani ditinjau dari rasio arginin-lisinnnya yang lebih besar daripada protein susu hewani atau

kasein (Damasceno dkk., 2000). Pada pengujian biologis secara in vivo diketahui bahwa protein kacang tunggak juga bersifat hipokolesterolemik (Kanetro, 2015).

Murti (2006), menyatakan bahwa yogurt berbahan baku susu kedelai yang difermentasi dengan *Streptococcus thermophilus* dan *Lactobacillus bulgaricus* akan menghasilkan yogurt dengan total bakteri asam laktat $1,5 \times 10^6$ sel/g yang berpotensi sebagai minuman probiotik/makanan fungsional.

Susu nabati yang banyak digunakan sebagai bahan pembuatan yogurt saat ini adalah susu kedelai. Padahal harga kedelai di pasaran saat ini sangat tinggi, disebabkan pemenuhan kebutuhan kedelai Indonesia sebagian besar adalah impor. Kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 1,8 juta ton/tahun, dengan pasokan impor 1,2 juta ton sementara produksi lokal hanya 620 ribu ton (Suara Pembaruan Daily, 2008).

Biji kecipir merupakan sumber protein nabati yang berpotensi sebagai bahan baku yogurt, karena berkadar protein tinggi (32,8 %) setara dengan kadar protein kedelai (35,1 %) (Haryoto, 2002). Rasio arginin-lisin protein kecipir juga hampir sama dengan protein kedelai (Kanetro dan Dewi, 2013). Penelitian diarahkan untuk memanfaatkan biji kecipir sebagai bahan baku yogurt, namun berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui susu kecipir yang dihasilkan berbangu langu. Oleh karenanya dalam penelitian digunakan isolat protein biji kecipir sebagai bahan baku yogurt. Tujuan penelitian ini adalah menentukan potensi hipokolesterolemik yogurt isolat protein biji kecipir melalui uji biologis in vivo menggunakan tikus jantan *Sprague dawley*.

METODE PENELITIAN

Bahan

Bahan utama penelitian ini adalah biji kacang kecipir (*Psophocarpus tetragonolobus*) diperoleh dari Toko Benih di Yogyakarta. Tikus *Sprague dawley* diperoleh dari UHP UGM, Yogyakarta untuk pengujian biologis secara in vivo. Bahan-bahan kimia untuk pakan dan pengujian biologis secara in vivo, meliputi aloksan (Sigma), maizena, casein, vitamin mix, mineral mix, sukrosa, kolin bitartat, minyak kedelai, dan kolesterol kit (*Diasys Diagnostic System GmbH & Co*). Bahan kimia untuk isolasi protein yaitu HCl (Merck), dan NaOH (Merck).

Pembuatan Isolat Protein

Pembuatan isolat protein biji kacang kecipir diawali dengan pensuspensian tepung biji dengan aquades (1:10), pengaturan pH 9 untuk melarutkan protein dan sentrifugasi. Supernatan yang diperoleh merupakan larutan protein kemudian diatur pada pH isoelektris dan sentrifugasi. Endapan yang diperoleh dipisahkan selanjutnya dikeringkan untuk mendapatkan isolat protein kering yang digunakan sebagai bahan dasar yogurt.

Pembuatan Yogurt

Langkah-langkah tahap ini adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan starter induk

Susu sapi segar sebanyak 20 ml ditambah susu skim 4 % (b/v), kemudian dipasteurisasi selama 15 menit pada 90 °C setelah itu didinginkan 40 °C. Setelah itu dibagi menjadi 2 bagian (masing-masing 10 mL), kemudian diinokulasi dengan kultur *S. thermophilus* sebanyak 3 ose ke dalam 10 media dan *L. bulgaricus* 3 ose ke dalam 10 ml media (umur kultur murni 1 minggu setelah kultivasi dalam media MRS agar). Selanjutnya diinkubasi pada 37 °C selama 10 jam. Starter induk yang terbentuk kemudian dituang pada 25 mL susu sapi yang telah ditambah skim dan dipasteurisasi, kemudian diinkubasi pada 37 °C selama 10 jam. Selanjutnya starter 25 mL yang terbentuk dituang pada 400 mL susu sapi dan diinkubasi pada 37 °C selama 10 jam.

2. Pembuatan yogurt isolat protein kecipir

Pembuatan yogurt susu kecipir diawali dengan pembuatan isolat protein kecipir. Pembuatan isolat susu biji kecipir yaitu biji kecipir rendah lemak dilarutkan

dalam alkali (pH 9) sehingga dihasilkan ekstrak dan residu/ampas, ekstrak yang dihasilkan pH-nya diatur 4,5 yang menghasilkan gumpalan protein dan cairan, gumpalan protein yang dihasilkan dicuci dan dikeringkan. Diagram alir proses pembuatan yogurt disajikan pada Gambar 1.

Pengujian Biologis secara *in vivo* Profil Lipida Darah Yogurt Isolat Protein Biji Kecipir

Sebanyak 18 ekor tikus, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 diberi pakan standar saja, kelompok ke 2 diberi pakan standar dan bubuk yogurt susu kacang kecipir konsentrasi rendah, kelompok 3 diberi pakan standar dan bubuk yogurt susu kacang kecipir konsentrasi tinggi. Diagram alir pengujian pengaruh yogurt isolat protein kecipir pada profil lipida darah hewan uji disajikan pada Gambar 2.


Tikus dipelihara selama 4 hari sebagai masa adaptasi, selanjutnya diperlakukan kondisi hiperkolesterol dengan 10% lemak babi selama 7 hari. Perlakuan dengan yogurt susu kecipir dilakukan selama 2 minggu.

Pada akhir minggu ke 1 dan minggu ke 2, setelah pemberian yogurt yang berbeda konsentrasinya dilakukan uji profil lipida darah (meliputi: kadar kolesterol, kadar trigliserida, kadar HDL dan HDL).

Setelah tikus berada pada kondisi hiperkolesterol, selanjutnya dilakukan pembagian 18 hewan uji. Tikus diberi pakan dan air secara *ad libitum*. Pembagian kelompok tikus adalah sebagai berikut:

- Kelompok 1: sebanyak 6 tikus diberi pakan standar, diberi air suling *ad libitum*, selama 2 minggu, profil lipida darah diuji setiap minggu.
- Kelompok 2: sebanyak 6 tikus diberi pakan standar, diberi air suling *ad libitum*, dan diberi yogurt konsentrasi rendah, profil lipida darah diuji setiap minggu.
- Kelompok 3: sebanyak 6 tikus diberi pakan standar, diberi air suling *ad libitum*, dan diberi yogurt konsentrasi tinggi, profil lipida darah diuji setiap minggu.

Uji profil lipida darah dilakukan dengan menggunakan



Gambar 1. Diagram alir proses pembuatan yogurt

Gambar 2. Uji pengaruh yogurt isolat protein kecipir pada profil lipida darah hewan uji

hewan uji tikus *Sprague dawley* yang diperlakukan dengan pakan hiperkolesterol selanjutnya diperlakukan dengan pakan yogurt isolat protein kecipir. Uji dilakukan terhadap profil total kolesterol, trigliserida, HDL dan LDL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Total Kolesterol

Pada Tabel 1, menunjukkan bahwa hasil uji statistik ada interaksi antar perlakuan (konsentrasi yogurt yang diberikan dan waktu pengamatan) terhadap profil total kolesterol hewan uji. Hewan uji yang tidak diperlakukan dengan yogurt susu kecipir, pada pengamatan minggu ke 4, profil total kolesterolnya tinggi (233,86 mg/dL). Sedangkan hewan uji yang diperlakukan dengan yogurt isolat protein kecipir (2 g/hari) profil kolesterolnya lebih rendah, turun menjadi 144,18 %. Perlakuan hewan uji dengan yogurt isolat protein kecipir (4 g/hari) tidak terlalu signifikan terhadap pengurangan profil total kolesterol lipida darah hewan uji. Terjadi penurunan total kolesterol 38 %, pada pemberian yogurt 2 g/hari dan penurunan sebesar 50 %, pada pemberian yogurt 4 g/hari.

Standar kolesterol normal menurut *US National Cholesterol Education Program* (NCEP) adalah kurang dari 200 mg/dL (Anonim, 2007). Berdasarkan data penelitian ini diketahui bahwa level kolesterol pada saat kondisi hiperkolesterol melebihi batas normal. Level kolesterol pada masa pemeliharaan selama 2 dan 4 minggu dengan pemberian pakan yogurt terbukti dapat menormalkan level kolestereol, seperti terlihat pada Tabel 1.

Comas dan Gilliland (2003) menyebutkan bahwa probiotik yang dibuat dari proses fermentasi dilaporkan dapat menurunkan profil kolesterol pada manusia. Mekanisme yang mungkin terjadi adalah terjadinya *deconjugasi* garam empedu di usus halus dengan adanya mikroba probiotik. Pendapat lain menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas bakteri probiotik akan menghasilkan produk yang dihasilkan selama fermentasi yang akan menghambat terbentuknya kolesterol di tubuh.

Tabel 1. Profil total kolesterol (mg/dL) pada perlakuan yogurt isolat protein kecipir

Perlakuan terhadap tikus	Konsentrasi yogurt		
	0 g/hari	2 g/hari	4 g/hari
Masa adaptasi	94,16 ^a	94,94 ^a	101,29 ^b
Kondisi hiperkolesterol	226,28 ^e	220,78 ^f	227,45 ^{hi}
Pengamatan 2 minggu perlakuan	231,88 ^{ij}	181,09 ^e	160,85 ^d
Pengamatan 4 minggu perlakuan	233,86 ^j	144,18 ^d	116,21 ^c

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji statistik dengan DMRT tingkat kepercayaan 5 %.

Disamping itu rendahnya kolesterol, karena bakteri probiotik terjadi karena perbaikan metabolisme, pengurangan *constipasi*, meningkatkan sistem kekebalan, peningkatan toleransi phenol dan detoksifikasi potensi karsinogen.

Trigliserida

Pada Tabel 2, menunjukkan bahwa hasil uji statistik ada interaksi antar perlakuan (konsentrasi yogurt yang diberikan dan waktu pengamatan) terhadap profil trigliserida hewan uji. Hewan uji yang tidak diperlakukan dengan yogurt susu kecipir, pada pengamatan minggu ke 4, profil trigliserida tinggi (178,20 mg/dL). Sedangkan hewan uji yang diperlakukan dengan yogurt isolat protein kecipir (2 g/hari) profil kolesterolnya lebih rendah, turun menjadi 113,28 mg/dL (sekitar 36 % dari semula). Perlakuan hewan uji dengan yogurt isolat protein kecipir (4 g/hari) turun menjadi 88,22 mg/dL (penurunan 50 %), lebih rendah dibanding perlakuan yogurt 2 g/hari.

Standar trigliserida normal menurut *US National Cholesterol Education Program* (NCEP) adalah kurang dari 150 mg/dL (Anonim, 2007). Berdasarkan data penelitian ini diketahui bahwa level trigliserida pada saat kondisi hiperkolesterol melebihi batas normal. Level trigliserida pada masa pemeliharaan selama 2 dan 4 minggu dengan pemberian pakan yogurt terbukti dapat menormalkan level trigliserida, seperti terlihat pada Tabel 2.

Profil trigliserida darah identik dengan profil kolesterol hewan uji. Dimungkinkan metabolit hasil fermentasi yang ada setelah proses pengeringan mampu menurunkan kadar trigliserida darah tikus percobaan.

Tabel 2 Profil trigliserida (mg/dL) pada perlakuan yogurt isolat protein kecipir

Perlakuan terhadap tikus	Konsentrasi yogurt		
	0 g/hari	2 g/hari	4 g/hari
Masa adaptasi	53,33 ^a	58,15 ^b	56,42 ^{ab}
Kondisi hiperkolesterol	173,23 ^e	177,20 ^{hi}	176,95 ^{hi}
Pengamatan 2 minggu perlakuan	175,12 ^{hi}	143,53 ^f	129,35 ^e
Pengamatan 4 minggu perlakuan	178,20 ⁱ	113,28 ^d	88,22 ^c

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji statistik dengan DMRT tingkat kepercayaan 5 %.

HDL Kolesterol

Pada Tabel 3, menunjukkan bahwa hasil uji statistik ada interaksi antar perlakuan (konsentrasi yogurt yang diberikan dan waktu pengamatan) terhadap profil HDL hewan uji. Hewan uji yang tidak diperlakukan dengan yogurt susu

Tabel 3. Profil HDL (mg/dL) pada perlakuan yogurt isolat protein kecipir

Perlakuan terhadap tikus	Konsentrasi yogurt		
	0 g/hari	2 g/hari	4 g/hari
Masa adaptasi	114,70 ^{fg}	118,29 ^{hi}	116,84 ^h
Kondisi hiperkolesterol	43,85 ^b	43,18 ^{ab}	47,87 ^c
Pengamatan 2 minggu perlakuan	41,20 ^{ab}	58,25 ^d	69,33 ^e
Pengamatan 4 minggu perlakuan	39,34 ^a	84,91 ^f	111,26 ^g

1 Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji statistik dengan DMRT tingkat kepercayaan 5 %.

kecipir, pada pengamatan minggu ke 4, profil HDL rendah (39,34 mg/dL). Sedangkan hewan uji yang diperlakukan dengan yogurt isolat protein kecipir (2 g/hari) profil HDL lebih tinggi, meningkat menjadi 84,91 mg/dL (meningkat 54 %). Perlakuan hewan uji dengan yogurt isolat protein kecipir (4 g/hari), HDL meningkat menjadi 111,26 mg/dL (meningkat 65 %), lebih tinggi dibanding perlakuan yogurt 2 g/hari. Perlakuan pakan yogurt terbukti dapat memperbaiki level HDL sehingga hampir sama dengan masa adaptasi khususnya pada perlakuan pakan 4 g/hari pemeliharaan 4 minggu yang tidak berbeda nyata dengan masa adaptasi perlakuan pakan 0 g/hari. Standar HDL normal pada manusia menurut *US National Cholesterol Education Program* (NCEP) adalah lebih dari 60 mg/dL (Anonim, 2007) dan pada tikus lebih dari 45mg/dL (Herlina dkk., 2013).

14 HDL mempunyai fungsi 14 mengangkut kelebihan kolesterol untuk dibawa ke jaringan hati dan selanjutnya akan diuraikan kemudian dibuang ke dalam kandung empedu sebagai asam (cairan empedu). HDL akan membersihkan kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh darah dengan mengangkutnya kembali ke hati. Konsentrasi HDL yang tinggi menunjukkan pengaruh positif konsumsi bubuk yogurt pada profil lipid darah. Semakin besar konsentrasi HDL lipid darah akan memperkecil resiko terkena tekanan darah tinggi yang berakibat pada serangan stroke.

LDL Kolesterol

Pada Tabel 4, menunjukkan bahwa hasil uji statistik tidak ada interaksi antar perlakuan (konsentrasi yogurt yang diberikan dan waktu pengamatan) terhadap profil LDL hewan uji. Profil LDL lipid darah hewan uji tidak dipengaruhi oleh konsentrasi yogurt isolat protein kecipir yang diberikan. Hari pengamatan berpengaruh terhadap LDL profil lipid darah hewan uji. Apabila dibandingkan profil lipid darah hewan uji yang tidak diperlakukan dengan yogurt isolat protein kecipir, menunjukkan penurunan LDL yang cukup signifikan.

Tabel 4. Profil LDL (mg/dl) tikus dengan perlakuan yogurt isolat protein kecipir

Perlakuan terhadap tikus	Konsentrasi yogurt			Rata-rata
	0 g/hari	2 g/hari	4 g/hari	
Masa adaptasi	32,72	36,72	35,28	34,91 ^a
Kondisi hiperkolesterol	147,12	148,35	151,44	148,98 ^c
Pengamatan 2 minggu perlakuan	148,70	127,10	118,69	131,49 ^c
Pengamatan 4 minggu perlakuan	151,20	81,09	65,10	89,02 ^b

Pemberian pakan 2 g/hari pada hewan uji akan menurunkan profil LDL lipid darah sampai 46 %, sedangkan pemberian 4 g/hari akan menurunkan profil lipid darah hingga 57 %, sehingga perlakuan pakan yogurt terbukti dapat menormalkan level LDL. Standar LDL normal manusia adalah kurang dari 100 mg/dL (Anonim 2007), sedangkan pada tikus kurang dari 135mg/dL (Herlina dkk., 2013). 9 LDL mengandung lemak lebih banyak dari pada HDL, sehingga akan mengambang di dalam darah. LDL sering disebut sebagai lemak jahat karena dapat menyebabkan penempelan kolesterol di dinding pembuluh darah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensi hipolipidemic yogurt isolat protein biji kecipir ditunjukkan dengan penurunan trigliserida, total kolesterol, dan kolesterol LDL, serta peningkatan kolesterol HDL sesudah perlakuan pakan yogurt dengan konsentrasi rendah maupun tinggi. Perubahan profil lipid darah sesudah pemberian pakan yogurt yaitu total kolesterol turun hingga 38 %, trigliserida turun hingga 36 %, HDL meningkat hingga 54 % dan LDL turun sampai 46 %. Hal tersebut mengindikasikan bahwa yogurt isolat protein biji kecipir mampu menurunkan kolesterol.

15 UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan biaya penelitian melalui Program Hibah Bersaing tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Damasceno, N.R., Goto, H., Dias, M.D.R., Okawabata, F.S., Abdalia, S.P. dan Gidlund, M.A. (2000). Casein and soy protein isolate in experimental atherosclerosis influence

- on hyperlipidemia and lipoprotein oxidation. *Annals of Nutrition and Metabolism* **45**: 38-46.
- Drake, M.A., Chen, X.Q., Tamarapu dan Leenanon (2000). Soy protein fortification affect sensory, chemichal, and microbiological properties of dairy yogurt. *Journal of Food Science* **56**: 4-12.
- Haryoto (2000). *Susu dan Yoghurt Kecipir*. Kanisius, Yogyakarta.
- Herlina, Harijono, Subagio, A. dan Estiasih, T. (2013). Potensi hipolipidemik polisakarida larut air umbi gembili (*Dioscore esculenta L.*) pada tikus hiperlipidemia. *Agritech* **33**: 8-15.
- Kanetro, B. dan Dewi, S.H.C. (2013). Pengaruh berbagai kecambah kacang-kacangan lokal sebagai bahan dasar meat analog terhadap sifat fisik (tekstur), kesukaan, dan rasio arginin-lisin. *Agritech* **33**: 1-7.
- Kanetro, B. (2015). Hypocholesterolemic properties of protein isolate from cowpeas (*Vigna unguiculata*) sprout in normal and diabetic rats. *Procedia Food Science* **3**: 112-118.
- Mc. Comas, K.A. dan Gilliland, S.E. (2003). Growth of probiotic and traditional yogurt cultures in milk supplemented with whey protein hydrolysate. *Journal of Food Science* **68**: 2090-2095.
- Murti, S.T.C. (2006). *Pembuatan Bubuk Yogurt Susu Kedelai dengan Proses Pengeringan (Spray Drier) dan Penambahan Gum Arab*. Laporan Penelitian Dosen Muda Direktorat Pendidikan Tinggi. Universitas Mercu Buana, Yogyakarta.
- Nuraida, L. (1996). *Minuman dan Makanan Fungsional: Bifidobakteria. Kursus Singkat "Makanan Fungsional dan Keamanan Pangan"*. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Purwanto, A. (2001). *Efek Gizi Tempe terhadap Hiperlipidemia Pasien Rawat Jalan di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto*. Penelitian Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Rossi, E.A., Vendramini, R.C., Carlos, I.Z., de Olievera, M.G. dan de Valdez, G.F. (2005). Effect of new fermented soy milk product on serum lipid level in normocholesterolemic adult men. *Process Biochemistry* **40**: 1791-1797.

16% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 15% Internet database
- Crossref database
- 9% Submitted Works database
- 7% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	fr.scribd.com	Internet	1%
2	pdfcoffee.com	Internet	1%
3	repository.unika.ac.id	Internet	1%
4	coursehero.com	Internet	1%
5	researchgate.net	Internet	1%
6	e-journal.uajy.ac.id	Internet	<1%
7	eprints.upnyk.ac.id	Internet	<1%
8	Syiah Kuala University on 2021-01-06	Submitted works	<1%

9	firdausanaliskesehatan.blogspot.com	<1%
	Internet	
10	mamesahjimmy.wordpress.com	<1%
	Internet	
11	eprints.ums.ac.id	<1%
	Internet	
12	ktikebidanankeperawatan.wordpress.com	<1%
	Internet	
13	journal.ipb.ac.id	<1%
	Internet	
14	dinkes.malangkota.go.id	<1%
	Internet	
15	semirata2016.fp.unimal.ac.id	<1%
	Internet	
16	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
17	Bayu Kanetro. "Hypocholesterolemic Properties of Protein Isolate from..."	<1%
	Crossref	
18	sinta.unud.ac.id	<1%
	Internet	
19	Sultan Agung Islamic University on 2021-12-02	<1%
	Submitted works	
20	survepi.blogspot.com	<1%
	Internet	

21

okampung.com

Internet

<1%

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded sources
- Quoted material
- Small Matches (Less than 12 words)
- Manually excluded text blocks

EXCLUDED SOURCES

jurnal.ugm.ac.id	95%
Internet	
media.neliti.com	94%
Internet	
eprints.mercubuana-yogya.ac.id	94%
Internet	
scribd.com	33%
Internet	
es.scribd.com	30%
Internet	
docobook.com	28%
Internet	
pt.scribd.com	27%
Internet	
adoc.pub	25%
Internet	
journal.ugm.ac.id	22%
Internet	

text-id.123dok.com	21%
Internet	
neliti.com	21%
Internet	
123dok.com	20%
Internet	
lppm.mercubuana-yogya.ac.id	20%
Internet	
doaj.org	18%
Internet	
journal.ugm.ac.id	17%
Internet	
humaniora.journal.ugm.ac.id	17%
Internet	
dev.journal.ugm.ac.id	17%
Internet	
Universitas Sebelas Maret on 2018-05-31	17%
Submitted works	
Universitas Jember on 2023-03-26	17%
Submitted works	
Universitas Jember on 2023-03-26	17%
Submitted works	
ingentaconnect.com	17%
Internet	

garuda.kemdikbud.go.id	17%
Internet	
sciencegate.app	17%
Internet	
api.crossref.org	17%
Internet	
garuda.ristekdikti.go.id	16%
Internet	
garuda.ristekbrin.go.id	16%
Internet	
worldagroforestry.org	12%
Internet	
forda-mof.org	12%
Internet	
apps.worldagroforestry.org	11%
Internet	
caritulisan.com	9%
Internet	
id.123dok.com	8%
Internet	
id.scribd.com	3%
Internet	
worldwidescience.org	3%
Internet	

agrosainstek.ubb.ac.id	3%
Internet	
vdocuments.site	3%
Internet	
totokhariyono.blogspot.com	2%
Internet	
rizkyrp234.wordpress.com	2%
Internet	
makjoel.wordpress.com	2%
Internet	
kllinik-sehat.com	2%
Internet	
pubag.nal.usda.gov	2%
Internet	
protan.studentjournal.ub.ac.id	2%
Internet	
journal.instiperjogja.ac.id	2%
Internet	
repository.ipb.ac.id	1%
Internet	

EXCLUDED TEXT BLOCKS

Potensi Hipolipidemik Yogurt dari Isolat Protein Biji Kecapir(Psophocarpus
perpustakaan.unitomo.ac.id